



ΙΑΤΡΙΚΟ
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ



ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- ▣ Μετά τη βρογχοσκόπηση οι ασθενείς μεταφέρονται στην αίθουσα ανάνηψης, όπου αναπαύονται και παρακολουθούνται για διάστημα περίπου 30 λεπτών.
- ✓ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ.
- ✓ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΗΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ →
ΘΑΛΑΜΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ)



ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ →
ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ)



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ

- ❑ Οι ασθενείς (εσωτερικοί και εξωτερικοί) μετά τη βρογχοσκόπηση , θα πρέπει να είναι :
- ❑ *ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΙ.*
- ❑ *ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΑΠΝΟΗ.*
- ❑ *ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ.*



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:

- ❖ *ΝΑ ΦΑΝΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΟΥΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΩΡΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ)*
- ❖ *ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 4 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ)*



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ

- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
- ▣ Οι νοσηλευτές των βρογχοσκοπικών εργαστηρίων φροντίζουν για την ασφαλή έκπλυση και απολύμανση του βρογχοσκοπίου με στόχο να αποφευχθούν επιμολύνσεις και διαγνωστικές αστοχίες.
- ▣ Τα μέτρα απολύμανσης και αποστείρωσης θεωρούνται καφαινώδους σημασίας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας .




ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η πλειοψηφία των εξεταζόμενων σε βρογχοσκόπηση ,δεν έχει παρουσιάσει καμία σοβαρή επιπλοκή.

ΕΊΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ :

- Λοίμωξη στο λαιμό ή στη περιοχή του στήθους.
- Ερεθισμό στο λαιμό και στη μύτη.
- Βράγχος φωνής.
- Κόπωση ,Υπνηλία και καρδιακές αρρυθμίες.



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Οι επιπλοκές οι οποίες είναι δυνατόν να παρουσιαστούν μετά τη βρογχοσκόπηση οφείλονται:

- Στη προνάρκωση ,προκαλώντας:
 - ❖ Καταστολή του αναπνευστικού .
 - ❖ Υπόταση.
 - ❖ Αλλεργικές αντιδράσεις από φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

➤ *Στη τοπική αναισθησία ,προκαλώντας :*

- ❖ Λαρυγγόσπασμο .
- ❖ Βρογχόσπασμο .
- ❖ Αλλεργική αντίδραση στο τοπικό αναισθητικό .
- ❖ Ναυτία .
- ❖ Έμετο .

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

- *Στη βρογχοσκόπηση*
- Και*
- *Στις συνοδούς τεχνικές .*



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ:

ΑΙΤΙΑ :

- Το ίδιο το βρογχοσκόπιο .
- Υγρά τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ :

- Χορήγηση συμπληρωματικού οξυγόνου.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ :
(ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ).

ΑΙΤΙΑ :

- Είσοδος του βρογχοσκοπίου από τον λάρυγγα σε συνδυασμό με την υποξυγοναιμία → →
→ *ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ / ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ*

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ : (ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΕΡΩΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ).

ΑΙΤΙΑ :

➤ Τραυματισμός του αεραγωγού κατά τη διάρκεια της βρογχοσκόπησης :

✓ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗ.

✓ ΛΗΨΗ ΒΙΟΨΙΩΝ.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ :

Τοποθέτηση σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης του αέρα .

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ:

ΑΙΤΙΑ :

- ✓ Φραγμένος αεραγωγός ή κατεστραμμένος από κάποια πάθηση .
- ✓ Χειρισμοί επι αγγειοβριθών αλλοιώσεων .
- ✓ Λήψη βιοψιών .

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ :

Χορήγηση τοπικά μικρής ποσότητας φαρμάκων από το βρογχοσκόπιο .

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΠΥΡΕΤΟΣ :

Η πυρετική κίνηση $>38^{\circ}\text{C}$ εντός 24 ωρών από την βρογχοσκόπηση .

Είναι σύνηθες φαινόμενο και δεν απαιτείται θεραπεία .



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

*Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΥΣΧΙΔΗΣ, ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ
ΒΑΡΥΝΟΥΣΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ.*



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

*ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ
ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ
ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ
ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΕΣ.*





Σας ευχαριστώ